


**Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique**

GENRE	PYRRHURAS 1
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;	
<b>1- Conure de Hoffman</b>	<b>Pyrrhura Hoffmanni Gaudens</b>
<b>2- Conure perlée</b>	<b>Pyrrhura lepida lepida</b>
<b>3- Conure de souancé</b>	<b>Pyrrhura melanura souancei</b>
<b>4- Conure de molina</b>	<b>Pyrrhura molinae molinae</b>
<b>5- Conure à joues vertes</b>	<b>Pyrrhura molinae flavoptera</b>
<b>6- Conure à ailes de feu</b>	<b>Pyrrhura egregia egregia</b>
<b>7- Conure leucotique</b>	<b>Pyrrhura leucotis</b>
<b>8- conure à poitrine grise</b>	<b>Pyrrhura griseipectus</b>



STATUT DE PROTECTION	Toutes ces conures (forme sauvage) sont en annexe II B et donc déclarables à l'i-fap.		
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Longévité</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">20 - 30 ans</td> </tr> </table>	Longévité	20 - 30 ans
Longévité			
20 - 30 ans			

Longévité

20 - 30 ans

Mode de vie sociale	Les pyrrhura vivent essentiellement en forêt en groupe et seuls leurs cris permettent de les repérer facilement dans les arbres. Elles sont grégaires et se reproduisent par couple. Elles sont bruyantes.
Comportement et, en particulier sa dangerosité	Moins bruyantes que les autres "conures" les pyrrhuras sont toutes aussi intelligentes, joueuses et facilement apprivoisables. Elles sont aussi moins "destructrices" que leurs cousines. Leur bec reste malgré tout puissant et elles sont aussi très douées pour déceler la moindre "faille" dans leur volière pour s'échapper. Ce sont généralement des oiseaux prolifiques.

L'âge à la reproduction n'est atteint qu'à partir de 2 ans. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel et deux oiseaux de même sexe peuvent adopter un comportement de couple si on les apparie par erreur. Le sexage est vivement recommandé.. Les couples se forment rapidement et peuvent devenir très prolifiques. La femelle pond de 3 à 6 œufs qu'elle couve seule pendant 25 jours après la ponte du 2<sup>e</sup> œuf. Le mâle peut parfois accompagner la femelle dans le nid, sans couver et les deux parents nourrissent très bien leurs jeunes. Le nichoir sera de taille 25 cmx25 cm par 30 cm de hauteur, un trou d'envol de 6 à 8 cm, avec à l'intérieur une couche de copeaux de hêtre de 5cm d'épaisseur ou de sciure de bois mélangée à de la tourbe. Les jeunes sortent du nid vers 5-6 semaines puis sont sevrés entre 5 et 7 semaines. Il y aura facilement 2 à 3 couvées par an.

Pour les besoins d'entretien vous pouvez opter pour un mélange: 40% mélange perruches, 35% mélanges grandes perruches, 5% de mélange tourterelles, 10% de "semences sauvages" pour les principaux constituants et pour l'élevage: 19% mélange perruches, 15% mélange grandes perruches, 20% d'alpiste, 10% de "semences sauvages", 10% de chênevis pour les principales graines. Les fruits et secs seront proposés ainsi que des légumes, minéraux et eau. La pâtée d'élevage sera proposée en période de reproduction.

Les pyrrhuras seront logés de préférence par couple, dans des volières de 1 m(L) X 1 m(I) X 1 m(H) au minimum ou dans des cages d'élevage de 12 cm (L) X 50 cm (I) X 50 cm (H). L'élevage en colonie est à éviter. Ces oiseaux sont très actifs et ont besoin d'être occupés pour être en confiance. Des branches fraîches, des cordes voire des jouets leur seront proposées. Les oiseaux couchent souvent dans leur nid.

Pour la conure de molina il existe 5 sous-espèces, celle de "souancé" en contient 4 et notre "perlata" en contient 3. Il en résulte beaucoup de mélanges surtout pour la perlata très commune en élevage. Chez "molina" les mutations ont rendu cette espèce très populaire et très présente dans les élevages. "Griseipectus" est une ancienne sous-espèce de "leucotis" et "hoffmani" se reproduit plus tard que ses cousines. "Egregia" est facile à faire reproduire. Toutes les sous-espèces de "Leucotis" sont devenues des espèces à part entière.

Informations complémentaires




**« Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel. »**

# CARTE DE REPARTITION DES PYRRHURAS

- 1- Conure de Hoffman
- 2- Conure perlée
- 3- Conure de souancé
- 4- Conure de molina

- 5- Conure à joues vertes
- 6- Conure à ailes de feu
- 7- Conure leucotique
- 8- conure à poitrine grise

Les pyrrhuras ont des zones de répartition très peu étendues. Les cartes nous indiquent les pays où elles sont présentes, et quand nous avons l'information, nous donnons la répartition exacte ainsi que la localisation des sous-espèces.



## LÉGENDE

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| * Domaine océanique     | * Domaine montagnard |
| * Domaine continental   | * Domaine équatorial |
| * Domaine méditerranéen | * Domaine désertique |
|                         | * Domaine polaire    |