CHOUCADOR iris *Lamprotornis iris*

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES
(sauf mention contraire)
JOSÉ CARDOSO

Élevage en volière communautaire

© Michael Fitzsimmons

© MICHAEL FITZSIMMONS

Nom scientifique : *Lamprotornis Iris*
Classe : *Aves*
Ordre : Passériformes
Famille : Sturnidés

Particularité

Les Choucadors iris sont de beaux oiseaux toujours en mouvement, très curieux et farouches, ici ils vivent sur la côte atlantique, les gelées sont rares et de courte durée, pour les régions plus froides prévoir des abris hors gel, car ils sont assez sensibles des pattes. Il faut leur laisser le nid toute l'année car par mauvais temps ils leur arrivent d'y dormir.

La maturité sexuelle est acquise vers deux ans, leur chant se compose de plusieurs types de piaillement avec des cris d'alerte.

Pendant la période de reproduction, ils deviennent un peu plus agressifs envers les autres habitants de la volière : quelques courses-poursuites mais sans gravité, ils n'ont jamais cherché à manger les jeunes ou les œufs des autres nichées.

J'affectionne particulièrement le genre *Lamprotornis*, ils sont colorés, curieux de tout, faciles à détenir hors période de la reproduction et avec le moindre rayon de soleil ils sont simplement magnifiques à regarder.

Logement

Ça fait déjà quatre années que j'obtiens la reproduction de cette très belle espèce de choucador, j'en détiens deux couples, un jeune couple prêt pour l'année prochaine et un couple de six ans comme reproducteur. Ici le couple reproducteur est logé dans une volière extérieure plantée, de huit mètres de long par six mètres de large et entre deux et trois mètres de hauteur dû au dénivelé du terrain, à ceci une partie en panneau sandwichs de deux mètres par un mètre cinquante de large sur deux mètres de haut abrite les oiseaux du vent et de la pluie, on y trouve également la nourriture hors de portée de tous nuisibles. Comme locataire un couple de Merle a poitrine noire (*Turdus dissimillis*), un couple d'Araguira rougeâtre (*Coryphospingus cucullatus*), un trio de Tisserin vorabé (*Euplecte afer*), un couple de colombine turvert (*Chalcophaps indica*) et à la belle saison un couple de Lori coquet (*Charmosyna placentis*), tout ce petit monde partage et cohabite sans problème. Les merles animent le bas, l'Araguira et les Colombines turvert le milieu, les Choucador iris, tisserin vorabé et Lori coquet le haut de la volière. Les plantes sont un *Viburnum rhytidophyllum*, laurier-sauce, un *Schefflera taiwaniana*, un *Callistemon laevis* et un thuya. Elles attirent une multitude de petits insectes, sur le sol une couche de BRF évite l'assèchement de la terre en été et développe une bio faune. Tous se reproduisent.

Nourriture

En période de repos : trois récipients sont utilisés un avec l'uni pâtée (versele-laga) dans lequel j'ajoute des extrudé F16 (versele-laga), le deuxième avec de la pâtée aux œufs et le dernier avec une demi-pomme ou demi-poire par jour à laquelle j'incorpore des pinkies congelés, plus en saison autres fruits rouges. Baies de pyracantha, cotonéaster figurent aussi au repas.

Lors de la saison de reproduction des insectes vivants sont donnés en complément : Buffalos, vers de farine, teignes de ruche, grillons.

Reproduction

Le nid de type inséparable avec une préchambre est placé à l'abri des regards dans la partie intérieure, il est disponible toute l'année. Fin avril, le mâle coupe des bouts de feuille qu'il présente comme offrande à la femelle, après quelques courses-poursuites du mâle, la femelle accepte et commence à remplir le nid. Aussitôt le couple confectionne ensemble l'intérieur de petits morceaux de feuilles, plumes, mousse cela les occupe pendant trois à quatre semaines avant la ponte. La ponte se compose de quatre œufs de couleur bleu /vert moucheté de marron, la femelle couve dès le deuxième œuf. Après treize à quatorze jours d'incubation Les oisillons naissent nus et aveugles, il est très important de ne pas déranger le couple pendant cette période pour éviter tout abandon. Le va-et-vient incessant des parents avec de la nourriture vivante dans le bec nous informe de la voracité des jeunes, pinkies, petits vers de farine,

■ Portrait du Choucador iris

Le Choucador iris, également connu sous le nom d'Étourneau émeraude, présente un plumage d'un magnifique vert émeraude iridescent sur tout le corps avec une partie violette iridescente allant de la poitrine jusqu'au bas-ventre, le bec, les pattes et les yeux sont noir. Mâles et femelles sont identiques. Les juvéniles sont quant à eux vert émeraude comme les parents sauf pour la poitrine au bas-ventre qui est de couleur marron olive mat. **Longueur** : 21 cm. **Aire de répartition** : endémique à l'Afrique de l'Ouest, présent en Guinée, Sierra Léone et Côte d'Ivoire. Habite les plaines et savanes sèches.

© Doug Janson

En période de reproduction, ils deviennent un peu plus agressifs vis-à-vis des habitants de la volière : quelques courses-poursuites mais sans gravité, ils n'ont jamais cherché à manger les jeunes ou les œufs des autres nichées.

Nichoir dans la partie abritée de la volière avec trois poussins de six jours.

petites teignes de ruche, grillons et autres insectes qu'ils capturent dans la volière, il faut les voir faire du vol stationnaire pour attraper un papillon ou une araignée qui s'est égarée dans leur espace. Je les bague vers sept à huit jours en diamètre de 4,5 mm, vers neuf jours les canules des plumes commencent à percer, après vingt-quatre jours ils quittent définitivement le nid. Personnellement je n'ai jamais vu mes iris se cocher car ils sont très méfiants dès que je viens vers la volière : surgit un cri d'alarme et aussitôt ils se réfugient dans les plantes et quittent le nid. Les jeunes iris passent le reste de la saison avec les parents, ils deviennent autonomes pratiquement deux mois après leur sortie du nid. Suivant la météo ils font une deuxième portée dans l'année. ●

Poussins à deux jours

Poussins à neuf jours.

Poussins à neuf jours.

Poussins à 12 jours.

Juvénile à 18 jours.

Ponte de Merle à poitrine noire.

Couple