



MES AMOURS DE LORIS





Pourquoi les loris ?

1/Tout d'abord ils sont beaux, actifs et plein d'énergie

Curieux de tout , espiègles et très intelligents.

2/ ils se raréfient en aviculture par manque d'éleveurs ou un manque de réussite dans l'élevage ou à cause des formalités I-FAP ?

3/dans leurs biotopes ils subissent les effets de la modernisation ,braconnage, déforestation et les incendies à répétition.



Pourquoi ces trois espèces ?

Toutes sont de petites tailles entre 17 et 22 cm
Pour un poids de 35 a 135 gr

Toutes sont peu bruyantes.

Toutes se raréfient en aviculture

Toutes ont un statut II/B



Tous les loris présentés sont de statut II/B

Il correspond a la convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvage menacées dit convention de Washington ou CITES. Qui sont inscrits en trois annexes.

Annexe II = espèces pas nécessairement menacées d'extinction mais qui risqueraient de le devenir si leur commerce international n'était pas étroitement contrôlé.

B correspond a toutes les espèces inscrites a la CITES, ainsi que d'autres espèces que la communauté Européenne protège sur son territoire ou dont elle souhaite maitriser les flux, sont inscrites dans 4 annexes communautaires A,B,C,D



□Chapitre 1:

le logement

Sachant que ce sont des loris il conviendra de les installer dans une volière adaptée : sol et mur carrelés ou en panneaux de polycarbonate ou bien encore dans des volières suspendues , tout ceci pour accéder à un nettoyage moins contraignant pour mieux profiter de ces oiseaux.

Voici quelques exemples de volières :



Partie
intérieure
carrelée
avec
support
pour
nectar
/eau

(Photo EM)



Mise en
place des
copeaux
avant d'
ouvrir aux
loris

(Photo FM)



Partie
extérieure avec
abri contre les
intempéries
Et sol bétonné
pour permettre
un nettoyage
au karcher

Photo F.M



Partie intérieure
parpaings
recouverts de
polycarbonate
pour faciliter
le nettoyage

(Photo EM)



Couple de
lori coquet
rentré après
nettoyage

Photo F.M.



Partie intérieure De la volière des loriquets de goldies

photo FM



Volière
suspendue
incrustée
dans la haie

Photo José C



Volière suspendue
entièrement
démontable
pour le nettoyage.

Avec deux points
de nourrissage

Photo B.P.



Volière
suspendue dans
la pièce
d'élevage.

Le nettoyage
hebdomadaire au
karcher sol en
pente carrelé.

Photo B P



Couloir du
bâtiment
d'élevage , accès
aux nids.

Avec
déshumidificateur
: Humidité
comprise entre 55
ET 60 %

Photo B P



Partie
intérieure de
volière
surélevé,
voyez le coté
pratique pour
éviter les
éclaboussures
du nectar.
Nourriture
plus eau
posées au sol
sur un support



Pour les espèces plus fragiles prévoir un chauffage soufflant pour maintenir un hors gel ou une température de 8°C.

Les miens bénéficient d'une construction en panneaux sandwich, divisée en quatre volières de 1,60 mètre de long par 1 mètre de large sur 2 mètres de haut pour la partie intérieure. Le sol en béton peint est recouvert de copeaux (gros pétales de pin), toutes les parois sont en polycarbonate, un sas leur permettant de passer dans la partie extérieure de 2 à 4 mètres de long par 1 à 2 mètres de large sur 2 mètres de haut et gravier pour le sol .



Volière en
polycarbonate
intérieure
compartiment
loris papous, loris
coquets
Gros copeaux au
sol avec sas pour
l'extérieur

Photo José C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Cette construction dispose d'un éclairage naturel via le polycarbonate du toit et complétement par un néon led avec minuterie : 12 heures d'éclairage par jour, chauffage (12°C à 15°C en hiver) et ventilation (par extraction d'air).


Ils ont en permanence un nid à Leur disposition où ils dorment chaque nuit.

Chaque compartiment dispose de baignoires intérieures et extérieures en été.



Photo Jose C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



00:00,00





Pour éviter les contraintes du nettoyage, c'est une très bonne idée de prévoir des déflecteurs.

Ce qui empêche les déjections de coller aux parois

Les loris adorent se balancer au bout des chaines (chaines en plastique), cela fait partie de leur bien-être.



Partie extérieure
de volière 2X4 M
avec jeune mâle
papou de 1 an en
fin de mue.

Vidéo Jose C



Volière entièrement
extérieure 3m X 1m
pour les espèces
rustiques ou semi
rustiques avec nid
chauffant et une partie
abritée

Photo Jose C



Support central pour
nectar.
Cela évite les
projections
sur le grillage.
Le sol extérieur en
gravier
et coté abri en
BRF.

Photo Jose C



Nid chauffant
ouvert fait sur
mesure pour
accueillir une
résistance
électrique
chauffante.

Photo FM



Nid chauffant
avec un chauffe abreuvoir pour
pigeon en guise de résistance.

Pour info la résistance a une
vingtaines d'années et
fonctionne toujours.

Photo f'm

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Décoration de
branchages plus
des cordes pour
les loriquets de
swainson de
chez une amie

Photo A C



DES QUESTIONS ?





❑ chapitre 2

La NOURITURE



Avant toute chose, toujours laver ou changer les récipients avec le nectar de la veille.

Je nourris mes loris avec une préparation du commerce (Lori nectar de chez Aves). Cette préparation est dissoute dans l'eau tiède pour un prorata d'une cuillère doseuse de nectar pour quatre cuillères doseuses d'eau. La consommation journalière est de 100 ml environ de nectar pour un couple de lori coquet et 250ml pour les loris a bandeau rouge et les papous Stella.



Lori Papou Stella femelle sur sa gamelle de nectar

Photo Jose C.

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Lorinectar AVES
1dose nectar pour 4
d'eau

ou

20 grammes pour 100ml
d'eau

ou

4 cuillères doseuses
rases pour 100ml d'eau



Pour info
dose avec nektion-lori

7 cuillères doseuses
rases pour un litre d'eau



NEKTON	Teneur en PROTÉINES valeurs en %	Quantité de Nekton en grammes	Quantité d'eau en litre	Sucre de coco (Palm sugar) en grammes	Pollen frais en grammes (congelé)	Notes
	1 %	10 gr	1 litre			
	2 %	20,5 gr	1			
	3 %	31 gr	1			
	4 %	42 gr	1			
	5 %	53 gr	1			
	6 %	64 gr	1			
	7 %	75 gr	1			
Période repos	8 %	86 gr	1	15 à 20 gr	8 gr	
	9 %	97 gr	1			
	10 %	111 gr	1			
	11 %	123 gr	1			
	12 %	136 gr	1			
Période reproduction	13 %	150 gr	1	25 gr	30 gr	
	14 %	163 gr	1			
	15 %	177 gr	1			
Dosage NEKTON	16 %	190 gr	1			
	17 %	205 gr	1			20 ml poudre pour 100 ml d'eau
	18 %	220 gr	1			
	19 %	235 gr	1			
	20 %	250 gr	1			
	21 %	266 gr	1			



A ceci j'ajoute sur un pic des morceaux de fruits : cela évite d'avoir des fruits éparpillés sur le sol et garantit moins de gaspillage. Les fruits sont mis dès le matin :figue de barbarie, raisin, grenade, papaye, pomme, poire, mangue suivant arrivage dans la saison. Ils apprécient aussi la verdure: blette, endive, salade, pissenlit feuilles et fleurs dont ils raffolent.



Préparation
des fruits
sur leurs
support



Couple lori
coquet
Ils adorent
la grenade

Photo Jose C



Lori coquet

Le mâle et ses
deux jeunes

Photo José C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Tous loris adorent le raisin

Photo Jose C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Parents
et un
jeune
mâle

Photo Jose C



Tous les week-ends je distribue que du nectar sec (lori dry de chez Aves) avec les fruits et de l'eau en permanence bien évidemment. Ils feront eux même le mélange qui leur convient. De temps en temps je distribue du Gruau d'avoine , de la madeleine en petite quantité et des vers de farine.

Pour info : le nectar lori dry plus les fruits et l'eau a volonté vous permet de partir deux à trois jours. C'est pour cette raison que j'ai habitué mes oiseaux à en consommer. Cela diminue les contraintes au quotidien.



Aves loriDry
Dose journalière
4 a 5 cuillères par
couple (petit et
moyen lori)



Loris Papous qui
consomme une
feuille de
pissenlit

Photo José C



info : par temps froid gelé

Donner en priorité le nectar tiède aux loris vivant en extérieur toute l'année dès le lever du jour.

Si ils sont nourris au nectar sec, penser à change l'eau et à mettre de l'eau tiède, car ils peuvent s'abimer les papilles de la langue sur l'eau gelée.

Info :pendant l'élevage des jeunes au nids supprimé les fruits , car ils sont sujets a la formation de mycose buccale et au jabot



DES QUESTIONS ?





□Chapitre 3:

HYGIENE ET NETTOYAGE



Photo José C



Chez moi toutes les gamelles à nectar sont interchangeables dès le matin puis lavées au produit vaisselle , rincées à l'eau chaude et rangées pour le jour suivant .
Toutes les trois semaines les copeaux sont retirés et jetés. Les parois en polycarbonate sont nettoyées avec de l'eau chaude une première fois pour décoller la saleté des déjections ,puis rincées avec du sanytol dans l'eau chaude et je finis par le sol .
Une nouvelle couche de copeaux est mise en place .



Une fois par trimestre tous les oiseaux sont envoyés dans la partie extérieure et grand nettoyage au nettoyeur haute pression puis je désinfecte en pulvérisation avec saniterpen 90 .
Pour un traitement virucide et fongicide : diluer le produit à 5 % (soit 50 ml par litre d'eau) et laisser agir 15 min à 20°C.
Rincer abondamment.
Ne réintroduire les animaux qu'après séchage complet.
Remettre des branches fraîches et les copeaux



DES QUESTIONS ?





Avant l'acquisition vérifier la provenance de l'oiseau : bague fermée, enregistrement IFAP, certificat de cession et demander un test sanitaire PBFD, qui sera à votre charge mais combien important pour votre tranquillité et vous rassurer sur l'état de santé des Loris.
Après si possible respecter une quarantaine.



□ chapitre 4

Lori coquet (charmosyna placentis placentis)



Description :

C'est un loriquet de petite taille 17cm

Avec un poids de 36grammes. Longevité 10/13ans.

Ils sont principalement verts et le dimorphisme entre mâle et femelle est évident.

Le mâle a une couronne frontale vert jaune, les joues la gorge et les flancs sont rouges avec une couverture d'oreille et le croupion bleu brillant.

La femelle n'a pas de rouge et la couverture d'oreille est striée de jaune. Le croupion est aussi bleu brillant.

Il en existe quatre sous-espèces :

C.P. Intensior /C.P. Ornata /C.P. Subplacentis /C.P. Pallidor





Photo Iose C



Distribution des loris coquets :

Papouasie nouvelle guinée,
Indonésie, et quelque îles
environnantes (Kai , Aru ,
Moluques , Salomon)



Caractère et comportement :

- Les loris coquets sont agréables à vivre
- Ils sont très actifs, joueurs, et curieux de tout.
- Leurs cris ne sont pas forts, ce qui les rend très acceptables à entendre.
- Quand ils se déplacent sur les branches les mouvements sont vifs et saccadés. Leur vol est rapide et direct.
- Le bain c'est tous les jours, baignoire obligatoire.



La mère et ces deux jeunes Lori vif et mouvement saccadés

V'ideo Jose C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Particularité à la mise en couple :

-présenter le mâle à la femelle pendant deux, trois jours avec une séparation pour qu'ils fassent connaissance. Si le couple n'est pas harmonisé et qu'ils deviennent agressifs l'un vis à vis de l'autre, le mâle dresse les plumes du front et chasse la femelle (chez moi cela a duré deux mois avant que tout ne rentre dans l'ordre). Les placentis ont un fort caractère.

-Pendant ce temps d'adaptation, toujours doubler les point de nourrissage c'est primordial sinon il y aura mort de la femelle à moyen terme. Ceci est vrai pour tous les loris.



Reproduction :

Une fois installés, et quand les conditions leur conviennent ce sont des oiseaux relativement prolifiques et de bons parents. J'utilise un nid de fabrication maison en L avec un tiroir de fond, ce qui me facilite le nettoyage. Les dimensions sont : base 15cm X 15cm, hauteur 25cm et longueur 30 cm. Comme matériaux de fond j'utilise de la tourbe naturelle mélangée à des copeaux pour rongeurs ou de la paille de lin et je mets quelque feuilles de laurier sauce. La femelle se fait un plaisir de les découper en petits morceaux et de s'enduire les plumes avec.



Nid avec
 tiroir
 amovible

Photo Jose C



Photo Jose C



Deux semaines après les avances du mâle et les accouplements, la femelle pond deux oeufs à trois jours d'intervalle et commence à couvrir dès le deuxième œuf. L'incubation, assurée par les 2 parents dure de 20 à 24 jours. À la naissance, les poussins sont recouverts d'un duvet blanc gris et pèsent environ deux grammes .

Le baguage s'effectue entre le treizième et le quinzième jour avec une bague de 4,5mm. J'en profite pour changer les matériaux de fond du nid puis chaque semaine : même opération (à cause des déjections liquides) .



Jeune C.Placentis De 1 jour

Photo José C



C . Placentis de 10 Jours

Photo Jose C




C. Placentis
Bagué a 13
JOURS

Photo José C



Jeune mâle de
deux mois

Photo Jose C.



Les jeunes quittent le nid vers l'âge de six à sept semaines. Au bout de la première semaine ils commencent à se nourrir seuls mais réclament encore aux parents qui continuent de les nourrir et de leur faire découvrir les fruits et légumes. On peut laisser les jeunes avec les parents même après la ponte suivante. Ils sont très tolérants et attentionnés avec leur progéniture même si la femelle couve sa nouvelle ponte, tous dorment dans le nid. Je n'ai jamais eu de soucis d'œufs cassés ou de jeunes tués.



Jeune mâle de deux mois

Photo José C



Jeune mâle de deux mois

Photo José C



Mâle de six mois

Photo José C



lori coquet de une année

Photo José
C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Couple lori coquet

Photo FM



DES QUESTIONS ?





□ chapitre 5

Lori Papouasie (charmosyna papou Stella)



Description :

Taille : 17 à 20 cm sans la queue et 45 cm queue comprise

Poids : 90 à 135 Grammes

Longévité : 15 à 20 années

Les Stella ont un plumage à dominance rouge, les ailes sont vertes émeraude. Le liseré noir du haut de la tête s'étend de l'occiput jusqu'en dessous des yeux et encercle les plumes bleu- gris de la couronne(bleue chez les jeunes). Les cuisses et la bande abdominale ont une teinte noire lustrée de violet. Les femelles ont la culote et le bas du dos jaune. Le croupion est bleu, le bec est rouge-orange, les pattes sont oranges et les iris jaune-orange.



Particularité :

C'est le seul lori possédant une queue beaucoup plus longue que son corps, 17 à 20cm sans la queue et 48 cm queue comprise.

C'est aussi le seul lori à avoir une phase de couleur Rouge et une autre mélanique (excès de pigmentation foncée).

Le Stella fait partie des rares espèces où l'accouplement d'une variété rouge avec une variété mélanique ne fera pas de mutations.

On obtient uniquement des rouges ou des noirs.



Formation des couples

Mâle rouge X Femelle noire = mâle noir et femelle rouge

Mâle rouge X Femelle rouge = mâle et femelle rouge

Mâle noir X femelle rouge = mâle noir , femelle noire

Mâle noir X Femelle noir = male et femelle noirs

Mâle noir porteur de rouge X Femelle noir = mâle noir et
femelle rouge ou femelle noire

Mâle noir porteur de rouge X Femelle rouge = jeunes noir ou
rouge



Photo José C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Femelle
mélanique

photo FM



C'est le moment du bain
Regarder la souplesse des
plumes de la queue de
pratiquement 30 cm sur
le mâle

Vidéo Jose C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO




Distribution : le papou Stella est endémique à la Nouvelle Guinée Papouasie. Ce sont des oiseaux de montagne ils vivent entre 1500 et 3500 mètres d'altitude.

La forme rouge est dominante entre 1500m et 2500m.

Quant à la forme mélanique elle devient dominante entre 2500m et 3500m.

Les températures maximales que peut rencontrer un Stella en milieu naturel se situent entre 30° le jour et 0° la nuit.



Particularité du Stella noir
vu qu'il vivent à très
haute altitude, leurs
volières doivent être
fraîches et avec ombrage,
ils succombent quand la
température monte aux
environs de 40°C .



Une autre particularité
du lori papou
C'est la forme des
rémiges primaires.

Cette forme n'apparaît
qu'après la première
mue.

Photo José C



Stella et l'état visuel de bonne santé

Base du bec orange et pointe du bec orange-rouge liseré noir.

Pattes oranges.

Yeux vifs et bien ouverts.

Plumes du front et de la couronne épousant bien le crâne.

Photo José C



Photo Jose C




Photo
Jose C



Photo José C



Reproduction :

Les papous Stella ne sont pas les plus faciles à faire reproduire et Je pense que l'harmonie du couple y sera pour quelque chose .

Les miens sont dans une volière de 3m x 1m x 2m de haut, le nid est de forme verticale aux dimensions suivantes, base 25X25X40 cm de Hauteur avec trou d'envol de 8cm , le fond est tapissé de copeaux « rongeur » sans bûches sur une hauteur de 8 cm.

Après les avances du mâle : chant nasal, hochement de tête et du corps de haut en bas, dandinement de droite à gauche, sautellement latéral, roulement de langue et claquement du bec, la femelle se prête a l'accouplement, pendant l'acte il continue les claquements du bec. Plusieurs accouplement se succèdent dans la journée et cela sur plusieurs jours .



Au bout d'environ deux ou trois semaines la femelle pond son premier œuf et trois jours plus tard le deuxième ,que les deux parents couvent à tour de rôle.

L'incubation dure 28 A 29 jours, .

A la naissance Les Stella pèsent 4 à 5 grammes, sont couverts d'un duvet blanc. Progressivement un duvet gris foncé plus dense prend le dessus.

Les jeunes sont bagués à 15 jours en 6 mm. Ils quittent le nid vers l'âge de 65 jours .

Pour info : assez fréquemment les papous Stella enterrent à moitié les œufs quand ils quittent le nid, c'est pour cette raison que les copeaux sont sans bûches .Avant j'utilisais des copeaux de hêtre cela a détruit la couvée, œufs percés 5 jours avant l'éclosion.



Couple Stella
rouge

Photo Jose C



Expérience d'élevage :

Un ami éleveur avait un mâle de dix ans qui n'avait jamais reproduit , que des œufs clairs me dit-il, il est stérile. Suite à ça je lui ai demandé de me le prêter pour qu'il tienne compagnie à une jeune femelle de 18 mois .Quand ils se sont rencontrés « coup de foudre » accouplement dès le premier jour et continuellement jusqu'à la ponte.

Deux trois semaines plus tard, elle a pondu son premier œuf à ma grande surprise car je la pensais trop jeune. Suite à plusieurs échecs dans le passé : œuf cassé, œuf clair, abandon des œufs j'ai décidé cette année de ne pas mettre les œufs dans le même panier.



J'ai remplacé l'œuf par un leurre et je l'est mis en couveuse , le deuxième œuf fut pondu deux jours plus tard et laissé aux parents.

Une semaine plus tard je mire les œufs , les deux sont féconds . Le couple est très calme, pas de signe de nervosité , ils se relaient pour couver et n'ont pas d'agressivité envers moi.

Au vingtième jour je décide de remettre le premier œuf dans le nid mais ils avaient détruis le leurre (œuf de Latham) alors trop tard, élevage a la main obligatoire .



Stella rouge 1 jour



Stella rouge 2 jours

Photos José C



Jeune Stella 1 Jour nourri à la main.

Je nourris à la cuillère

Pâtée Versel-laga A18 diluée dans l'eau de source

Température de L'eau 37°C

1/6 eau le 1 Jour

1/5 eau le 2ème jour

1/4 eau le 3ème jour

1/3 eau pendant 4 semaines

Dés l'âge de 4 semaines et jusqu'au sevrage

Avec Nekton-lori (nectar)

1 cuillère Nekton rase pour 100ml

V'ideo Jose C



Température de la couveuse 37,5°C avec retournement
automatique 4 retournement par heure
Pendant 28 jours.

Température de l'éleveuse du premier jours et pendant deux
semaines 36°C



Stella rouge de 12 jours



Stella rouge 23 jours

Photos Jose C



Stella de 24 jours

Photo Jose C



Retrait du Stella à 48 jours
et du lori coquet suite à
abandon par les parents à
cause de la chaleur cet été
42°C



Jeunes Stella
Première sortie à neuf
semaines



Après le sevrage toujours surveiller la cavité buccale des papous la langue comprise pour voir si il n'y a pas de mycose qui se développe car ils y sont très sensibles.

Traitement:

- Préventif 6 gouttes Mycostatine pour 200ml de nectar. A faire après le baguage des jeunes pendant 7 jours.
- Curatif 16 gouttes Mycostatine pour 200 ml de nectar pendant 10 jours



Photo José C



DES QUESTIONS ?





DES QUESTIONS ?





❑ chapitre 6

Lori à bandeau rouge (*Glossopsitta concinna*)
ou
Lori musqué



Photo: José C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



Description :

Taille :22 cm

Poids :52 à 65 grammes

Longévité :15 à 25 années

Le lori musqué a un plumage principalement vert brillant , avec comme son nom l'indique un bandeau rouge qui couvre le front jusqu'à la couverture des oreilles. La calotte est bleue, une bande jaune marque les épaules , la nuque est jaune d'or, la base de la queue est rouge orangé à l'intérieur .Le bec noir à sa base et orange vers la pointe, les pattes sont grises .

Il dégage une odeur de musc très agréable.

Le mâle est légèrement plus grand et plus large que la femelle.

Sexage ADN obligatoire



Couple de lori musqué

Photo Jose C



Photo Jose C



Distribution :

les loris a bandeau rouge vivent sur une large partie du sud est de l'Australie y compris l'île kangourou et la Tasmanie .

On les trouve dans les forêts sèches et les bois clairsemés qui longent les cours d'eau .Ils sont considérés comme nomade car ils suivent la floraison des eucalyptus comme d'autres espèces de loris et perruches.



Particularité : outre leur odeur de musque sucré, les loris musqués sont des oiseaux assez calmes, pas trop bruyants et assez rustiques.

Ils sont curieux de tout, espiègles, joueurs et très attentifs à tout ce qui se passe autour de leur environnement.

En plus ils sont bons parleurs, les mâles chantent et parlent couramment.

En période de reproduction ils sont agressifs et gare à qui s'approche du nid.



Volière des bandeaux rouge
ils sont en extérieure
Toute l'année

Photo José C



Reproduction :

Mes musqués sont logés dans une volière extérieure de 3 mètres de long sur 1 de largeur et 2 mètres de haut couverte sur plus de la moitié, un nid bûche de 30cm X 15cm percé de plusieurs trous en son fond, est accroché dans la partie couverte, une fine couche de copeaux tapisse le fond. La ponte comporte 2 œufs comme la plupart des lorises, pondus à deux jours d'intervalle. Dans la journée seule la femelle couve mais les deux parents dorment la nuit dans le nichoir.



Les loris a bandeau rouge
Ne sont pas exigeants
quand a la forme du nid

Photo José C



Après 22 jours d'incubation , la naissance du premier jeune puis un a deux jours plus tard le deuxième. Ils naissent couverts d'un duvet blanc .

Jeune L. musqué de 2 jours

Photo Jose



De 13 a 15 jour c'est
ouverture des yeux ,
bague et nettoyage du
nid.

Bague de 5,5mm

Photo Jose C



21 Jours , inspection de l'oisillon le développement est bon, les plumes des ailes commencent à pointer, Les pattes sont impeccables il est en pleine forme.
J'en profite pour nettoyer le nid

Photo Jose C



Jeune de 30 jours

Photo Jose C



37 Jours et
dernier
nettoyage du
nid. Le jeune
profite bien.

Photo José C



Deux mois après le sevrage
retrait du jeune

Photo José C



Mâle musqué



Le couple reproducteur

Photo Jose C

• © UOF Visio UOF 2022 JOSE CARDOSO



DES QUESTIONS ?





FIN