

# Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	STREPTOPELIA
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;	
<b>1- TOURTERELLE RIEUSE</b>	<b>Streptopélia roseogrisera</b>
<b>2- TOURTERELLE TIGIRNE</b>	<b>Streptopélia chinensis</b>
<b>3- TOURTERELLE MAILLEE</b>	<b>Streptopélia sénegalensis</b>
<b>4- TOURTERELLE A TÊTE GRISE</b>	<b>Streptopélia tranquebarica</b>
<b>5- TOURTERELLE DES BOIS</b>	<b>Streptopélia turtur</b>
<b>6- TOURTERELLE TURQUE</b>	<b>Streptopélia decaocto</b>



STATUT DE PROTECTION	Elles ne sont dans aucune annexe sauf la "rieuse" qui est domestique. <b>et la tourterelle des bois en annexe A 1</b> (interdite aux "non professionnels")	Longévité	15 ans	Taille adulte	1- 30 cm pour 150 -200 g 2- 28-35 cm pour 150 200 g 3- 26-28 cm pour 60-130 g 4- 21-25 cm pour 100 g
"Rieuse et "tigrine" sont baguées en 6,5 mm, "maillée" en 5,5mm et "à tête grise" en 5,0 mm					

Mode de vie sociale	les tourterelles vivent en couples fidèles et sont très pacifiques et très sociables
Comportement et en particulier sa dangerosité	Animal affectueux et calme par excellence, elle cohabite bien avec d'autres espèces. La "rieuse" est très domestiquée et ne craint pas l'homme. les autres sont un peu plus farouches. En période de reproduction les mâles deviennent plus "territoriaux" et peuvent gêner la reproduction d'oiseaux de taille bien inférieure.
Mode de reproduction	Les parents couvent tour à tour (le ♂ le jour et la ♀ la nuit) deux œufs que la femelle aura pondus. La couvaison dure 14 jours et les jeunes sortent du nid à 20 jours (15 j pour "chinensis") et sont sevrés trois semaines plus tard. La femelle fait plusieurs pontes par an et il convient de séparer les jeunes une fois sevrés. Le nid "plateforme" ou en osier est bien accepté et il faudra fournir divers branchages aux oiseaux pour la confection du nid.

régime alimentaire et ration quotidienne	Mélange colombidés (rieuse) ou mélange pour exotiques et perruches. Toutefois on peut proposer : 50 à 60 % de divers millets, 15 % d'alpiste, 10 % de navette, 20 % de « grosses graines » pour les "rieuses"(blé et maïs cassés, gruau d'avoine, pois). Et diverses petites graines dont des "sauvages" surtout pour les plus petites espèces. La verdure fait partie du menu et les insectes à petites doses peuvent être consommés. L'eau en bonne quantité est indispensable. Attention, ces oiseaux « gaspillent » énormément et des ailes adaptées (type pigeon) seront les bienvenues
Conditions d'hébergement	les volières feront de 2 à 3 m de long minimum. La cage de 120 cm de long X50 cm de large et 120 cm de haut sera acceptée par la "rieuse" même si ce n'est pas la situation idéale. Un abri est le bienvenu (éventuellement légèrement chauffé). La "rieuse" est toutefois plus tolérante au froid. La baignoire est indispensable.

Informations complémentaires	Chez la "rieuse" la forme blanche avec un collier crème est bien une mutation à part entière et non pas une autre espèce que beaucoup appellent colombe. La blanche sans collier est une albinos (iris rose et bec plus clair). la maillée s'hybride facilement avec les autres "streptopélia". Il n'y a pas de dimorphisme sexuel sauf pour la tourterelle à tête grise. Le mâle est reconnaissable lorsqu'il fait la "cour" à une femelle. En volière communautaire le nombre de ♂ et de ♀ sera identique et le nombre de mangeoires augmenté pour pallier à la "territorialité des ♂".
------------------------------	---


: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».



# CARTE DE REPARTITION DES TOUTERELLES GENRE STREPTOPELIA

- 1- TOURTERELLE RIEUSE
- 2- TOURTERELLE TIGIRNE
- 3- TOURTERELLE MAILLEE
- 4- TOURTERELLE A TÊTE GRISE
- 5- TOURTERELLE DES BOIS
- 6- TOURTERELLE TURQUE

- Autres "streptopélia" moins courantes
- 7- TOURTERELLE A COLLIER *Streptopélia semitorquata*
  - 8- TOURTERELLE A DOUBLE COLLIER *Streptopélia bitorquata*
  - 9- TOURTERELLE A POITRINE ROSE *Streptopélia lugens*
  - 10- TOURTERELLE DE REICVHENOW *Streptopélia reichenowi*
  - 11- TOURTERELLE DU CAP *Streptopélia capicola*
  - 12- TOURTERELLE ORIENTALE *Streptopélia orientalis*
  - 13- TOURTERELLE PLEUREUSE *Streptopélia decipiens*
  - 14- TOURTERELLE VINEUSE *Streptopélia vinacea*



	Rare
	Pour toutes les espèces
	Introduite

Pour toutes les espèces

La tourterelle domestique est considérée dans certaines publications comme étant un oiseau issu de la sélection humaine à partir de la tourterelle rieuse, probablement. Elle n'existerait donc pas à l'état sauvage. Quoiqu'il en soit le nom latin utilisé est le même pour ces deux tourterelles.

La tourterelle des bois et la tourterelle turque sont des oiseaux "sauvages" et leur détention est interdite en France. La tourterelle des bois est en annexe A I, mais la tourterelle turque n'appartient à aucune annexe. Pour ces deux espèces il est important de se renseigner sur la législation avant de les acquérir.

