


Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

PHOTOS

GENRE	Eupsittula nandaya mylopsitta			Ø Bague	Taille adulte	Poids
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;						
1- Conure naine	Eupsittula	nana		/	26 cm	72 - 85 g
2- Conure à front rouge	Eupsittula	canicularis		5,5 mm	25 cm	68 - 80 g
3- Conure couronnée	Eupsittula	aurea		5,5 mm	28 cm	74 - 94 g
4- Conure cuivrée	Eupsittula	pertinax		5,5 mm	25 cm	76 - 102 g
5- Conure des cactus	Eupsittula	cactorum		/	25 cm	/
6- Conure nanday	Nandayus	nenday		6,5 mm	37 cm	120 - 141 g
7- Perruche veuve	Mylopsitta	monachus		6,0 mm	29 cm	90 - 140 g



STATUT DE PROTECTION

: La conure cuivrée est en annexe II B G et donc soumise à restriction de détention(elle est présente à l'état sauvage en Guyane). Les autres sont en II B et déclarables i-fap.

Longévité

20 à 30 ans

Mode de vie sociale

Les conures vivent en bande plus ou moins grande en dehors de la reproduction, puis les couples s'isolent pour se reproduire, sauf chez la perruche veuve qui vit en grandes colonies tout au long de l'année et dont les nids sont communautaires. Elles se déplacent en groupe et sont très bruyantes surtout si on les dérange.

Comportement et, en particulier sa dangerosité

Dans l'ensemble ces oiseaux sont calmes et s'apprivoisent facilement. On fera attention à son bec puissant. Le couple est général très lié. Les conures sont des oiseaux plutôt destructeurs et les volières en bois sont donc à prescrire.

Mode de reproduction

L'âge à la reproduction n'est atteint qu'à partir de 2 - 3 ans. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Les couples se forment rapidement et peuvent devenir très prolifiques. La femelle pond de 3 à 6 œufs qu'elle couve seule pendant 25 jours environ après la ponte du 2^e œuf. Le mâle peut parfois accompagner la femelle dans le nid, sans couvrir et les deux parents nourrissent très bien leurs jeunes. Le nichoir sera de **taille** 25x25 par 30 cm de hauteur, un trou d'envol de 6 à 8 cm, (10 cm pour "Nanday") avec à l'intérieur une couche de copeaux de hêtre de 5cm d'épaisseur ou de sciure de bois mélangée à de la tourbe. Les jeunes sortent du nid vers 6-8 semaines, puis sont sevrés entre 5 et 7 semaines. **La conure veuve** se reproduit en colonie "fabrique" son nid contrairement aux autres conures qui utilisent des cavités. Son nid comprendra un "vestibule" et pourra avoir les caractéristiques suivantes: Dimensions intérieures: 482 X 414 X 200 mm (H X L X P). Dimension du vestibule: 190 X 200 X 200 mm. Dimension de la chambre : 482 X 214 X 200 mm. Trou d'entrée: 74 mm . Il convient de leur fournir des matériaux : Brindilles, herbes, branches de saules etc.... Plusieurs nids pourront être accolés les uns aux autres. La perruche veuve est très prolifique et peut facilement faire deux couvées la même année et pour les autres conures on tablera sur une voire deux exceptionnellement.

régime alimentaire et ration quotidienne

En principe un mélange grandes perruches leur convient très bien et il sera complété par des fruits et légumes. Les proportions suivantes correspondent à ses besoins : 50% de mélange de graines, 45% de légumes et 5% de fruits et noix. Eau à volonté, minéraux complètent le régime. La pâtée d'élevage sera utile pour l'élevage des jeunes.

Conditions d'hébergement

Une volière de 2 à 4m de long X1,50mX2m de haut si possible au calme et plantée sera fournie à nos oiseaux. En cage on visera 1,20 m de long avec 0,70 m de large et 0,60 m de haut.



Informations complémentaires

Le bruit qu'elles font sera impérativement à prendre en compte autant pour des couples logés à l'extérieur que pour des oiseaux apprivoisés. Elles sont donc très joueuses mais aussi très destructrices et les jouets en bois proposés en feront les frais. Il est bon de leur fournir de quoi occuper leur bec.



: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».

AOCV85 - G. BESSON - JUIN 2021

28/12/2021


CARTE DE REPARTITION DES Eupsittula, Nandaya, Mylopsitta

- 1- Conure naine
- 2- Conure à front rouge
- 3- Conure couronnée
- 4- Conure cuivrée
- 5- Conure des cactus
- 6- Conure nanday
- 7- Perruche veuve



La conure cuivrée est présente en Guyane française.

La conure de Nanday est introduite aux USA et en Uruguay; la conure veuve aux USA au Japon et en Europe et de plus elle niche en Espagne et en Italie.



- * Domaine océanique
- * Domaine continental
- * Domaine méditerranéen

- * Domaine montagnard
- * Domaine équatorial
- * Domaine tropical

- * Domaine désertique
- * Domaine polaire