

Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	AMADINA et LONCHURA	Ø Bague	Taille adulte	Poids	
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;					
1- AMADINE A TÊTE ROUGE	Amadina erythrocephala	2,7 mm	14 cm	24 g	1
2- AMADINE COU COUPE	Amadina fasciata	2,7 mm	12 cm	15-30 g	2
3- PADDA DE JAVA	Lonchura oryzivora	3,2 mm	15 cm	25 g	3
4- PADDA DE TIMOR	Lonchura fuscata	2,9 mm	14 cm	22 g	4
STATUT DE PROTECTION	les Amadines ne sont présentes dans aucune annexe, tandis que les paddas sont en annexe II B, donc déclarables i-fap.		Longévité		
			5 ans pour les paddas et 10 pour les amadines		
Mode de vie sociale	Ces oiseaux ont l'habitude de vivre en bande et se reproduisent en colonies quand l'occasion se présente. les paddas sont plutôt calmes L'amadine à tête rouge est plus sociable que sa cousine et moins "agressive".				
Comportement et, en particulier sa dangerosité	Le bec des paddas est puissant et la cohabitation avec des Estrildidés par exemple peut s'avérer délicate. Les amadines sont sociables mais peuvent s'avérer brutales avec des oiseaux plus timides qu'eux. Les paddas, amadines et tisserins peuvent cohabiter ensemble. on évitera de les loger avec des petits astrilds, Cordon-bleu ou Bengalis par exemple.				
Mode de reproduction	Sociables les paddas peuvent se reproduire en colonies dans de grandes volières ou bien par couples dans des cages de reproduction. Le nid est de forme de boite, avec un trou d'envol circulaire ou rectangulaire: les dimensions préconisées sont 15 x 15 x 25 cm environ. Le nid peut au départ être garni par de la fibre de coco et ensuite le mâle le complètera avec de la fibre qu'on lui laisse à disposition. Pour les amadines les nids seront du même type. Les pontes sont de 4 à 6 œufs couvés pendant 14 jours, les jeunes restent au nid pendant trois semaines puis sont sevrés 15 jours plus tard comme chez les paddas.				
régime alimentaire et ration quotidienne	Si l'amadine est presqu'exclusivement granivore, le pappa ne dédaigne pas la nourriture vivante. Cependant une pâtée aux œufs est la bienvenue et on veillera à ne pas engraisser les amadines par une ration trop riche en protéines car elles prennent facilement de l'embonpoint. On proposera un peu de verdure et l'eau sera à volonté. La nourriture vivante sera proposée pour la reproduction de ces deux espèces. Les minéraux (grit os de seiche) ne feront pas défaut. Ces oiseaux peuvent se reproduire à partir de la première année.				
Conditions d'hébergement	la cage de reproduction pour un couple sera assez spacieuse de 0,80 m à 1 m de long sur 0,40 à 0,50m de large et de haut. La volière sera suffisamment spacieuse et on ne logera pas d'autres espèces d'oiseaux sauf paddas, amadines et tisserins, mais il faudra tout de même être vigilant.				
Informations complémentaires	On ne mélangea pas les deux espèces d'amadines car elles s'hybrident facilement et leurs descendants ne sont pas stériles. L'amadine (cou coupé principalement) est connue pour dénicher facilement les autres oiseaux et être assez agressive. Les amadines sont des oiseaux résistants, supportant bien les grosses chaleurs mais craignant l'humidité. Il y a un dimorphisme sexuel pour ces quatre espèces considérées.				



: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ». AOCV85 - G. BESSON - JUIN 2021 20/12/2021

CARTE DE REPARTITION DES AMADINA et LONCHURA (PADDAS seulement)

- 1- AMADINE A TÊTE ROUGE
- 2- AMADINE COU COUPE
- 3- PADDAS DE JAVA
- 4- PADDAS DE TIMOR

