

Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	LES INSEPARABLES	STATUT DE PROTECTION	
<p>Cette fiche est faite pour vous aider à différencier les différents types de ces oiseaux et à éviter les confusions entre les espèces. Les croisements sont toujours néfastes. Trois grands types existent et ils vous sont présentés ci-dessous avec leurs particularités.</p>		<p>Fischeri, pdersonatus et rosécolis ne sont soumis à aucune restriction et pour les autres espèces un certificat de capacité est nécessaire pour plus de 100 oiseaux détenus. (Arrêté du 8 octobre 2018)</p>	
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;	Ancien nom	Longévité	
<p>Groupe avec dimorphisme sexuel</p>			
Agapornis pullarius	insépable à tête rouge	Pullaria	Tous les mâles de ce groupe possèdent une différence de plumage avec les femelles et ils ont tous une bande sous-alaire noire. Ces trois formes sont moins courantes en élevage.
Agapornis canus	insépable à tête grise	cana	
Agapornis taranta	d'Abyssinie	taranta	
<p>Groupe avec cercle oculaire blanc</p>			
Agapornis personatus	inséparable masqué	personata	Ils ont tous un cercle oculaire blanc et il n'y a pas de dimorphisme sexuel apparent. Ces quatre espèces sont apparentées, puisque les croisements entre eux donnent des jeunes féconds.
Agapornis fischeri	inséparable de Fischer	fFischeri	
Agapornis nigrigensis	inséparable à joues noires	Nigrigensis	
Agapornis lilianna	inséparable de Lilian	Liliane	
<p>Groupe sans cercle oculaire blanc et sans dimorphisme sexuel</p>			
Agapornis rosécolis	inséparable rosegorge	rosécolis	Cette forme intermédiaire ne possède pas de cercle oculaire blanc et ne présente pas non plus de dimorphisme sexuel.
		<p>inséparable masqué Mâle et femelle : Il possède un cercle oculaire blanc. La tête, les joues et le menton sont noir profond sur l'arrière de la tête se transformant en brun olive terne. Tout autour du cou, de l'avant jusqu'en haut de la poitrine, court un col jaune profond. Le reste du plumage est vert, plus foncé sur les parties supérieures et plus clair sur les inférieures. Le bec est rouge corail.</p>	
		<p>inséparable de Fischer Mâle et femelle : Le cercle oculaire blanc est bien présent. Le front, les joues et la bavette sont rouge orangé. La nuque est bronze brunâtre, avec une légère teinte dégradée orange à la limite du vert. Le bec est rouge, Le corps est vert pastel, les flancs la poitrine et le ventre sont légèrement vert jaunâtre. Le croupion bleu violacé.</p>	
		<p>inséparable à joues noires Mâle et femelle : La tête est de couleur noire (avec des reflets bruns). Les yeux, noirs également, sont entourés d'un large cercle orbital blanc. La gorge et le cou sont jaune citron. Le reste du plumage est vert, plus foncé sur les parties supérieures et plus clair sur les inférieures. Le bec est rouge corail.</p>	
		<p>inséparable rosegorge Mâle et femelle : La face et le haut de la poitrine sont rose pêche, d'où le nom d'espèce, et rouge vif sur le front entre les deux yeux. Les yeux sont roux jaunâtre. Il n'y a pas de cercle oculaire blanc. Le bec présente une coloration corne à l'extrémité noire et une cire blanche. Ils présentent une coloration générale vert pâle, un peu plus sombre sur les parties supérieures. Le croupion est bleu brillant.</p>	
<p>« Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».</p>			
<p>AOCV85 - G. BESSON - NOVEMBRE 2025</p>		11/11/2025	

CARTE DE REPARTITION DES inséparables

1-Les inséparables

- Agapornis personatus** **inséparable masqué**
Agapornis fischeri **inséparable de Fischer**
Agapornis nigrigensis **inséparable à joues noires**
Agapornis roséicolis **inséparable rosegorge**

Ø Bague	Taille adulte	Poids
4,5 mm	15-16 cm	43-47 g
4,5 mm	13-15 cm	42-58 g
4,5 mm	14 cm	35-45 g
4,5 mm	15-16 cm	43-63 g



Informations complémentaires

Les inséparables sont très répandus en captivité surtout chez les particuliers car ils sont très résistants, rustiques et peu chers à l'achat. Ils s'adaptent très facilement en cage ou en volière et ne demandent pas beaucoup d'entretien. De plus ils se reproduisent facilement. Ils sont cependant assez bruyants et parfois agressifs entre eux.


Leurs couleurs vives les font remarquer facilement et les nombreuses mutations dont ils peuvent être porteurs ajoutent un attrait non négligeable à leur détention. Ce sont essentiellement des mutations de couleurs sauf pour le panaché ou le dessin est altéré.

régime alimentaire et ration quotidienne

Le mélange que l'on peut qualifier d'idéal serait :

45 % d'alpiste,
8 % de millet blanc,
8 % de tournesol,
4 % de sarrasin,
4 % de riz paddy,
3 % de niger.

Type de nid utilisé



Bleu de mer



Bleu masque blanc



Lutino



Bleu



Panaché dominant



Bleu cobalt



Bleu



Lutino



Quelques mutations pour les quatre principaux types élevés, qui vous montrent les ressemblances possibles entre les types: attention donc à la pureté des mutants, certains n'hésitant pas à faire du croisement : pour obtenir certaines couleurs.

Les principales informations sur sa détention et son élevage sont disponibles sur la fiche "AGAPORNIS"